

# PATIENTENKARTE

## UPLIZNA® ▼ (Inebilizumab)

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden (siehe letzte Seite).

Version 2.0 März 2025  
601/87213/25

**AMGEN**



## Angehörige der Heilberufe:

erhält UPLIZNA für NMOSD.

**UPLIZNA KANN ZU SCHWEREN NEBENWIRKUNGEN FÜHREN.**

Achten Sie auf Symptome, um Infektionen frühzeitig zu erkennen:

- Schwere Infektionen
- Reaktivierung von Viren
- Opportunistische Infektionen
- Progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML)

**UPLIZNA** ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung (NMOSD) bei Erwachsenen, die Anti-Aquaporin-4 (AQP4)-Antikörper-positiv sind. Bei NMOSD greift das Immunsystem gesunde Teile des zentralen Nervensystems (ZNS) an. Diese Schübe verursachen eine Entzündung des ZNS. Die betroffenen Teile des ZNS sind i. d. R. der Sehnerv, das Rückenmark, das Gehirn und der Hirnstamm. UPLIZNA ist ein Antikörper, der auf B-Zellen abzielt, die sich gegen Ihr ZNS richten. Durch die Depletion der B-Zellen werden die Entzündung und die Wahrscheinlichkeit von Schüben verringert.

## Zu den Symptomen eines NMOSD-Schubes gehören:

- Sehstörungen
- Schwäche der Gliedmaßen
- Muskelkrämpfe oder sonstige Schmerzen
- Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Darm- oder Blasenentleerung
- Starke Übelkeit, Erbrechen oder Schluckauf

Bei wiederholten Schüben können Schäden im ZNS entstehen. Diese Schübe können schließlich schwere und dauerhafte Behinderungen bis hin zu Lähmungen oder Erblindung verursachen. NMOSD kann sogar die Atmung beeinträchtigen und zum Tod führen.

## WICHTIGE MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN VON UPLIZNA

**Das Infektionsrisiko ist erhöht.**  
Es können schwerwiegende oder ungewöhnliche Infektionen auftreten.

**Sprechen Sie mit Ihrem Arzt**, wenn Sie Symptome einer Infektion haben wie:

- Verstopfte oder laufende Nase
- Halsschmerzen oder Husten
- Rote, schmerzhafte oder blasenbildende Haut
- Schmerzhafte und häufiges Wasserlassen
- Brennen, Taubheit oder Kribbeln
- Kurzatmigkeit
- Starke Müdigkeit
- Schmerzen im ganzen Körper
- Fieber oder Schüttelfrost
- Stechende Schmerzen

**Virale Infektionen, die Sie früher hatten, können wieder aktiv werden.**

Das kann passieren, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Ein Beispiel für eine ernste Infektion ist die Hepatitis, eine Leberinfektion. Vor jeder Behandlung wird bei Ihnen ein Hepatitis-Test durchgeführt. Informieren Sie bei Symptomen einer Infektion immer Ihren Arzt.

**Progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML)**

ist eine seltene Infektion des Gehirns. PML kann zum Tod oder zu schwerer Behinderung führen. Sie kann mit leichten Symptomen beginnen, sich aber im Laufe von Tagen oder Wochen verschlimmern.

**Zu den Symptomen einer PML gehören:**

- Schwäche auf einer Seite des Körpers
- Veränderung der Sehkraft
- Verwirrtheit
- Schwerfälligkeit in Armen und Beinen
- Veränderungen des Denkens, Gedächtnisses oder der Persönlichkeit
- Neu auftretende Krampfanfälle

**Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eines dieser Symptome bei Ihnen auftritt.**

**Tragen Sie diese Karte immer bei sich.**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem [Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Straße 51–59, 63225 Langen, www.pei.de](#) melden oder der [Amgen GmbH, Abteilung für Arzneimittelsicherheit](#) unter [0800 2643658](#) oder [eudemicalsafety@amgen.com](mailto:eudemicalsafety@amgen.com).

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Die Gebrauchsinformation ist auch online durch Scannen des QR-Codes oder über [www.uplizna-rm.de](http://www.uplizna-rm.de) verfügbar.**



**Kontaktieren Sie Ihren Arzt** bei Symptomen einer Infektion oder PML:

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Medizinisches Zentrum